


Insuficiencia cardíaca: Digoxina - [Heart Failure: Digoxin]



La digoxina ayuda a su corazón a bombear mejor la sangre. La gente generalmente la toma una vez al día en forma de pastilla. También pueden administrarle este medicamento si está en el hospital. En este caso, podría administrarse a través de una aguja colocada en una vena en su brazo (vía intravenosa, o IV).

¿Cómo funciona la digoxina?

Si tiene insuficiencia cardíaca, su corazón no bombea sangre tan bien como debería. La digoxina reduce la velocidad de las contracciones del corazón y las fortalece. Esto permite al corazón bombear más sangre con cada latido.

¿Por qué se utiliza la digoxina para la insuficiencia cardíaca?

Es posible que su médico le haya recetado digoxina, debido a que todavía está teniendo síntomas mientras está tomando otros medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón en las piernas y estar muy cansado.

¿Qué tan bien funciona?

Los estudios de investigación muestran que la digoxina ayuda a reducir los síntomas de la insuficiencia cardíaca. También podría disminuir las probabilidades de que requiera estar hospitalizado.

Efectos secundarios

Pregúntele a su farmacéutico sobre los efectos secundarios de cada medicamento que toma. También se listan los efectos secundarios en la información que viene con su medicamento.

Una sobredosis de digoxina (también llamada intoxicación por digoxina) puede ocurrir si tiene demasiada digoxina en la sangre.

Llame a su médico de inmediato si presenta síntomas de una sobredosis:

- Pérdida del apetito
- Problemas estomacales, como náuseas, vómito o diarrea
- Pérdida de la visión
- Confusión
- Cambios en los latidos cardíacos (rápidos, lentos o irregulares)

Llame a su médico si cree que está teniendo un problema con su medicamento. **Llame al 911 de inmediato** si cree que está teniendo una reacción grave, como dificultad para respirar.

Qué hay que considerar

Es posible que se haga pruebas con regularidad para revisar el nivel de digoxina en la sangre. Su médico se asegurará que usted toma una cantidad segura de digoxina.

Infórmele a su médico sobre todos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos que tome. Otros medicamentos pueden cambiar la cantidad de digoxina en la sangre de modo que tenga demasiada digoxina.